© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

26. N. obscurus Müll.
27. Cochlicopa lubrica Müll.
28. Pupa doliolum Brug. immer mut. albina.
29. P. muscorum L.
30. P. pusilla Müll.
31. Balea perversa L.
32. Clausilia laminata Mont.
33. Cl. ventricosa Drap. neu für diese Gegend; nur in 1 Exemplare gefunden.
34. Cl. lineolata Held.
35. Cl. dubia Drap.
36. Cl. bidentata Ström.
37. Cl. parvula Stud.
38. Cl. biplicata Mont.
39. Succinea putris L.
40. Carychium minimum Müll.
41. Ancylus fluviatilis Müll.

Neue tunisische Unionen.

Von

W. Kobelt.

Unio Micelii n. sp.

Concha transverse ovata, fere rhomboidea, valde inaequilatera, solida, ponderosa, ruditer irregulariterque sulcato-costulata, olivaceo-nigricans; margo superior arcuatus postice descendens, inferior strictus, pone medium subretusus, anterior subcompressus, breviter rotundatus, oblique in inferum abiens; posterior in rostrum rectum, vix attenuatum, dein rotundato-truncatum productus. Umbones ante $^1/_3$ longitudinis siti, tumidi, intorti, parum prominuli, in speciminibus exstantibus erosi; ligamentum elongatum, crassum; lunula lanceolata, inter umbones intrans. Cardo crassus; dens valvae

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

dextrae crassus, pyramidalis, postice incisione distincta triangulari a margine cardinali dilatato sejunctus, dentes valvae sinistrae compressi, crenati, sulco angusto divisi, sed divergentes, anterior subduplex; lamellae humiles, solidae; impressiones musculares anteriores magnae, profundae, subintrantes, posteriores superficiales; linea pallearis distinctissima, crenata; callus humeralis crassissimus, ultra medium productus, dimidiam faciei internae occupans; margarita rosacea.

Long. 92, alt. 45, crass. 32 mm.

Hab. in flumine Medjerda Tunisiae.

Unio Medjerdae n. sp.

Concha elongato-ovata, valde inaequilatera, solida, ponderosa, ruditer striata, olivaceo-nigrescens; margo superior arcuatus, ascendens, inferior strictiusculus, pone medium subretusus, anterior compressus, oblique in inferiorem desinens, posterior in rostrum breve depressum desinens. Umbones ad $^1/_3$ longitudinis siti, tumidi, antice rectangulatim truncati, depressi, contigui; ligamentum crassum elongatum, sinu brevissimo; lunula rhomboidea brevis, inter umbones vix intrans. — Cardo sat fortis; dens valvae dextrae crassus, subcompressus, rotundato-triangularis, crenatus, fossula distincta sat profunda antice, et incisione distincta a margine cardinali sejunctus, dentes valvae sinistrae approximati, subcompressi, fovea cardinali laterali vix discreti, subdivergentes; lamellae crassae, elatae, dextra cultellata; impressiones musculares anteriores profundae, sat magnae, subintrantes, posteriores superficiales; impressio pallearis distincta, crenulata; callus humeralis crassus, marginem inferiorem totum occupans; margarita carnea.

Long. 84, alt. 48, crass. 32 mm.

Hab. in flumine Medjerda Tunisiae.